


5 dní před biopsií vysadit léky proti krevní srážlivosti - Anopyrin, Godasal, Stacyl apod. Warfarin alespoň 4 dny předem s kontrolou krevní srážlivosti den předem

Poučení před ultrazvukovým vyšetřením prostaty přes konečník a odběrem vzorků tkáně

Vyšetření se uskuteční dnev hod na naší ambulanci.

Transrektální ultrazvukové vyšetření prostaty (TRUS) je vhodné k posouzení objemu prostaty a struktury prostatické tkáně. Lze jím vyšetřit i semenné váčky. Spočívá v celkem bezbolestném zavedení ultrazvukové sondy do konečníku (šíře sondy je zhruba shodná s šířkou prstu), tedy obdoba vyšetření prostaty přes konečník.

K vyloučení či potvrzení závažného onemocnění prostaty je třeba někdy provést odběr vzorků prostatické tkáně – biopsii. Ta se provádí za pomoci ultrazvuku kvůli přesnému zaměření místa, odkud mají být vzorky odebrány. I toto vyšetření je minimálně bolestivé a velmi dobře tolerováno.



1. Před odběrem vzorků prostaty je potřeba vyprázdnit konečník. **Večer před vyšetřením zavedete do konečníku 1-2 glycerinové čípky** – volně zakoupíte v lékárně. **V den vyšetření ráno opět 1 glycerinový čípek.** V případě, že trpíte chronickou zácpou, je vhodnější použít volně prodejné salinické klysmo, které dostanete v lékárně. Ráno v den vyšetření lehce posnídat a napít se!!!

2. Před odběrem tkáně dostanete preventivně jednorázově **antibiotikum. Jednu tabletu polknete ráno v den vyšetření přibližně 1-2**

hodiny před výkonem, druhou tabletu za 8 hodin po první a třetí za dalších 8 hod. Pokud nemáte poruchu imunity nebo cukrovku, další tablety již není třeba užívat.

3. Vyšetření trvá asi 20 minut a provádí se ambulantně dle přání v místním znecitlivění na levém boku (je doporučeno Evropskou urologickou společností, biopsie je výrazně lépe tolerována). Speciální jehla na aplikaci anestezie není bohužel hrazena zdravotními pojišťovnami, cena anestezie s jehlou je 1000Kč (lze platit i kartou). Odebírá se minimálně 10-12 vzorků. Po skončení vyšetření musíte nejméně 1/2 hodinu vyčkat v čekárně.

4. Po vyšetření dodržujte klidový režim a je nutné zvýšit příjem tekutin na 2-3 litry/den. Může se objevit krev ve stolici, v moči, spermatu i v močové trubici. Tyto příznaky mohou přetrvávat 3 až 7 dní, krev ve spermatu i několik týdnů po výkonu. Je nutné se vyvarovat po 2-3 dny větší fyzické námahy, pohlavního styku, horké vanové koupele (pouze sprchovat) a nekonzumovat alkohol.

5. V případě větších zdravotních problémů, např. zástava močení, vysoká tělesná teplota (nad 37,5°C), zimnice či třesavka je bezpodmínečně nutné bez předchozího objednání přijít na naši ambulanci. V případě nepřítomnosti našeho lékaře je nutné navštívit nejbližší nemocniční urologické pracoviště kdykoli.

6. V případě větších komplikací je někdy nutná krátkodobá hospitalizace.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Celý tým urologické ambulance Uroderm Medical s.r.o.